

## 植物二磷酸核酮糖羧化酶 (Rubisco) 试剂盒说明书

(货号: G0602F24 紫外法 24 样)

### 一、产品简介:

核酮糖-1,5-二磷酸核酮糖羧化酶 (Rubisco, EC 4.1.1.39) 是植物光合作用中的一个关键酶, 既控制着CO<sub>2</sub>的固定, 同时又制约着碳素向Calvin循环和光呼吸循环分流, 其活性的大小直接影响着光合速率, 初始活性可反映体内酶的活化状态, 总活性为体内已活化的酶加上潜在活化的酶活性。

在 Rubisco 的催化下, 1 分子的核酮糖-1, 5-二磷酸 (RuBP) 与 1 分子的 CO<sub>2</sub> 结合, 产生 2 分子的 3-磷酸甘油酸 (PGA), 在 3-磷酸甘油酸激酶和甘油醛-3-磷酸脱氢酶的共同作用下, 产生甘油醛-3-磷酸, 并使还原型辅酶 I (NADH) 氧化。因此, 通过检测 340nm 下 NADH 的下降速率, 即可得出 Rubisco 的酶活性大小, 为了使 NADH 的氧化和 CO<sub>2</sub> 的固定同步。本试剂盒加入了 ATP 再生系统。

### 二、试剂盒的组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 30mL×1 瓶	4°C保存	
试剂一	粉剂 mg×2 支	-20°C保存	用前甩几下或离心使粉剂落入底部, 每支分别加 0.6mL 蒸馏水溶解备用。用不完的试剂分装后保存, 禁止反复冻融, 三天内用完。
试剂二	液体 μL×1 支	-20°C保存	用前甩几下或离心使试剂落入底部, 再分别加 1.1mL 蒸馏水溶解备用。用不完的试剂分装后保存, 禁止反复冻融。
试剂三	粉剂 mg×1 支	4°C保存	
试剂四	液体 15mL×1 瓶	4°C保存	
试剂五	液体 1mL×1 支	-20°C保存	一次性用不完可分装保存于-20°C。

**【注】**本试剂盒仅提供 24 个样本的初始活性检测或者 24 个样本的总活性检测。

### 三、所需的仪器和用品:

紫外分光光度计、1mL 石英比色皿 (光径 1cm)、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

### 四、二磷酸核酮糖羧化酶 (Rubisco) 活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

#### 1、样本制备:

① 组织样本: 称取约 0.1g 组织样本, 加入 1mL 提取液, 冰浴匀浆, 12000rpm, 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

**【注意】**若样本颜色较深 (如植物叶片), 可引起起始值 A1 值较大如超过 1.5, 可在样本制备过程中增加除色素步骤: 取约 0.2g 组织 (水分充足的样本可取 1g), 加入 1mL 的 80%乙醇冰浴匀浆, 12000rpm, 4°C离心 10min, 弃掉色素较深的上清液; 以上除色素步骤重复 2 次。最后向离心得到的沉淀中加入 1mL 提取液, 混匀或再次冰浴匀浆, 12000rpm, 4°C离心 10min, 取上清置冰上待测。

② 细菌/细胞样本: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 12000rpm 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

**【注】:**若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量 (10<sup>4</sup>): 提取液 (mL) 为 500~1000: 1 的比例进行提取。

#### 2、上机检测:

① 紫外分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 340nm, 蒸馏水调零。

② 提示：一般以检测初始活性为主。若检测总活性则该试剂盒从可以检测 24 个样本减少为 12 个样本。

③ 所有试剂解冻至室温（25℃），在 1mL 石英比色皿（光径 1cm）中依次加入：

试剂名称（μL）	初始活性测定管	总活性测定管
样本	30	30
试剂一	40	40
试剂二	40	40
试剂三	40	40
试剂四	500	500
试剂五	40	混匀，25℃孵育 15min
		40
轻轻混匀，室温（25℃）条件下，于 340nm 处检测，10s（待反应体系稳定）时读取 A1，10 min 后读取 A2， $\Delta A=A1-A2$ 。		

- 【注】** 1. 初始活性测定管，加完试剂五后立即按照操作说明书检测；总活性测定管于 25℃孵育 10min 后再加试剂五，再按照操作说明书检测；
2. 若 10s 后反应体系未稳定可延长到 1min 再读值。
3. 若  $\Delta A$  的值在零附近，可适当延长反应时间 T（如由 10min 延长到 20min 后读 A2），或增加样本加样量 V1（由 30μL 增至 60μL），则改变后的 T 和 V1 需代入计算公式重新计算。
4. 若 A1 值太大如超过 2（如颜色较深的植物叶片，一般色素较高，则起始值相对会偏高），可适当减少样本加样量 V1（由 30μL 减至 10μL），则改变后的 V1 需代入公式重新计算。
5. 若  $\Delta A$  值大于 0.4，则需减少反应时间 T（如减至 5min），则改变后 T 需代入公式重新计算。
6. 若下降趋势不稳定，可以每隔 20S 读取一次吸光值，选取一段线性下降的时间段来参与计算，相对应的 A 值也代入计算公式重新计算。

## 五、结果计算：

### 1、按样本蛋白浓度计算：

单位定义：每毫克组织蛋白在每分钟内氧化 1 nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

Rubisco 活力(nmol/min /mg prot)=[ $\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9$ ] ÷ (V1 × Cpr) ÷ T = 369.8 ×  $\Delta A \div Cpr$

单位定义：每毫克组织蛋白在每分钟内固定 1 nmol CO<sub>2</sub> 定义为一个酶活力单位。

Rubisco 活力(nmol CO<sub>2</sub>/min/mg prot)=[ $\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9$ ] ÷ (V1 × Cpr) ÷ 2 ÷ T = 184.9 ×  $\Delta A \div Cpr$

### 2、按样本鲜重计算：

单位定义：每克组织在每分钟内氧化 1nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

Rubisco 活力(nmol/min/g 鲜重)=[ $\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9$ ] ÷ (W × V1 ÷ V) ÷ T = 369.8 ×  $\Delta A \div W$

单位定义：每毫克组织蛋白在每分钟内固定 1 nmol CO<sub>2</sub> 定义为一个酶活力单位。

Rubisco 活力(nmol CO<sub>2</sub>/min/mg prot)=[ $\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9$ ] ÷ (W × V1 ÷ V) ÷ 2 ÷ T = 184.9 ×  $\Delta A \div Cpr$

### 3、按细胞数量计算：

单位定义：每 10<sup>4</sup> 个细胞每分钟内氧化 1nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

Rubisco 活力(nmol/min/10<sup>4</sup> cell)=[ $\Delta A \times V2 \div (\epsilon \times d) \times 10^9$ ] ÷ (500 × V1 ÷ V) ÷ T = 369.8 ×  $\Delta A \div 500$

V--加入提取液体积，1 mL； V1--加入样本体积，0.03mL； d--光径，1cm；

V2--反应体系总体积，6.9×10<sup>-4</sup> L；  $\epsilon$ --NADH 摩尔消光系数，6.22×10<sup>3</sup> L/ mol/cm； W--样本质量，g；

2--每固定 1 nmol CO<sub>2</sub> 有 2 nmolNADH 被氧化； T--反应时间，10min； 500--细胞数量，万；

Cpr--蛋白浓度（mg/mL），建议使用本公司的 BCA 蛋白含量测定试剂盒。